

平成23年度 露地いちじく（柘井ドーフィン）病害虫防除暦

JA佐渡 いちじく倶楽部

回数	散布時期	散布日	主な対象病害虫	薬剤名	散布濃度	10a散布量	収穫前日数	水100L当たり薬量	使用上の注意点
1	3月下旬～4月上旬	月 日	カイガラムシ類 ハダニ類	石灰硫黄合剤	7倍	200L	発芽前	14L	・風のない日に丁寧に散布する。 ・カキリムシ類発生園はガットサイドSを4月中旬に原液塗布する。
2	5月下旬～6月上旬	月 日	アザミウマ類 カミキリムシ類 疫病	モスピラン水溶剤 コサイドボルドー クレフノン	2,000倍 1,000倍 200倍	200L	前日 -	50g 100g 500g	・疫病の感染初期なので、前年多発園地や多雨年には特に注意する。 ・カミキリムシの幼虫が、木くず、虫ふんを出すので食入孔から園芸用キンチョールEを噴霧し殺虫する。 ・土壌から菌の跳ね返りを防ぐため、敷ワラ、マルチをする。
4	6月25日頃	月 日	アザミウマ類 疫病	オルトラン水和剤 コサイドボルドー	2,000倍	200L	45日前 -	50g 100g	・1～2段目の果実の芽がわずかに開く頃（果実の横径20～25mmの頃）が散布の目安。 ・収穫45日前・1回なので、収穫前日数に注意する。 ・疫病の発生果実はほ場内に放置せず、ほ場外へ持ち出し処分する。
5	7月10日頃	月 日	アザミウマ類 カミキリムシ類 疫病	モスピラン水溶剤 コサイドボルドー クレフノン	2,000倍 1,000倍 200倍	200L	前日 -	50g 100g 500g	・降雨が多い時は、必ず多発するので、薬剤散布の間隔を詰めるとともに、排水対策を徹底する。 ・梅雨明け後も降雨が少なく高温乾燥が続く時は、ハダニ類の発生に注意し、発生が見られたら初期に殺ダニ剤を散布する。
6	7月下旬	月 日	アザミウマ類 疫病 さび病	ダントツ水溶剤 アミスター10フロアブル	3,000倍 1,000倍	200L	前日 前日	33g 100ml	・ハダニ多発園ではマイトコーネフロアブル1,000倍を単用散布する。 ・アミスター10フロアブルに代えてダコニール1000(2,000倍)でも良い。
臨時	8月上中旬	月 日	アザミウマ類	アクタラ顆粒水溶剤	2,000倍	200L	前日	50g	・アクタラ顆粒水溶剤に変えてコテツフロアブル2,000倍でもよい。 ・腐敗果実はショウジョウバエの発生源となるのでほ場内に放置しない。 ・ショウジョウバエは、酵母腐敗病の原因となるので、ほ場周囲にショウジョウバエの発生原因となるもの（野菜くずなど）を放置しない。
6	8月下旬	月 日	疫病	ダコニール1000	2,000倍	200L	前日	50ml	・ダコニール1000に代えてランマンフロアブル(2,000倍)でも良い。
臨時	収穫期間	月 日	アザミウマ類	スカウトフロアブル	2,000倍	200L	前日	50ml	・腐敗果実はショウジョウバエの発生源となるのでほ場内に放置しない。 ・ショウジョウバエは、酵母腐敗病の原因となるので、ほ場周囲にショウジョウバエの発生原因となるもの（野菜くずなど）を放置しない。
塗布	4月(発芽前) 7月下旬	月 日	カミキリムシ類	ガットサイドS	原液塗布		7日前		・葉にかかると薬害を生じるので注意する。 ・4月と産卵期である7月の2回、株元から結果母枝まで塗布する。

※葉の銅(ボルドー)の薬害防止にのため、クレフノンを混合散布す。

※散布時期は目安です。生育及び病害虫の発生状況を判断し、適期防除に努めましょう。

いちじく使用除草剤					
薬剤名	使用時期	使用回数	使用時期	散布量10a	
バスタ液剤	収穫前日まで	3回	/ / /	L	
ラウンドアップマックスロード	収穫7日前	3回	/ / /	L	

※オルトラン水和剤については、使用時期、使用回数には十分注意すること。

※コサイドボルドーは、発芽期、収穫期には使用しない。

(薬害及び果実汚れの恐れがあるので注意してください。)

ダニ剤の使用について					
薬剤名	使用時期	散布濃度	水100L当たり薬量	収穫前日数	使用回数
サンマイト水和剤	発生初期	1,000～1,500倍	67g～100g	7日	1回
ピラニカ水和剤	発生初期	2,000倍	50g	7日	1回

マイトコーネフロアブル	7月下旬頃	1,000倍	100ml	前日	1回
-------------	-------	--------	-------	----	----

※マイトコーネフロアブルは、ダニ大発生の場合、7月下旬防除(2回目)で散布しましょう。

※サンマイト、ピラニカは同系統の薬剤ですので、2剤の内どちらかを使用すること。

いちじく使用農薬		
薬剤名	使用時期	使用回数
石灰硫黄合剤	発芽前	-
コサイドボルドー	-	-
ダコニール1000	収穫前日	2回
アミスター10フロアブル	収穫前日	3回
オルトラン水和剤	収穫45日前	1回
スカウトフロアブル	収穫前日	3回
モスピラン水溶剤	収穫前日	3回
園芸用キンチョールE	収穫前日	2回
サンマイト水和剤	収穫7日前	1回
ガットサイドS	収穫7日前(4月～7月)	3回
アクタラ顆粒水和剤	収穫前日	2回
コテツフロアブル	収穫前日	2回
ダントツ水溶剤	収穫3日前	3回