

令和2年度定植 いちご 生産登録書・栽培管理日誌

日本一安心・安全でおいしい農産物の島「佐渡」
の実現を目指そう！

産地全体で取り組もう

- 「安全・安心」は、一人ひとりの日々の作業記録
- 「高品質でおいしいいちごづくり」は、適期の管理
- 「環境にやさしいいちごづくり」は、土作りと適正な施肥とJA佐渡防除暦に沿った病害虫防除の実践

●提出についての注意事項（この用紙は3回提出いただきますので、保管に注意ください。）

- 提出期日
- 1回目提出 定植終了後または、10月15日まで
 - 2回目提出 収穫開始前
 - 3回目提出 収穫終了後または、7月15日まで

※毎回期日まで必ず提出くださるようお願いいたします！！

※用紙の提出およびJA確認印がなければ出荷できませんのでご注意ください。

○提出場所 最寄りの営農窓口まで提出をお願いいたします。

●その他

提出いただいた個人情報、JA佐渡の生産指導及び、農業共済組合への情報提供のみに使用し、管理はJA佐渡が責任を持って行います。

管理日誌は2回目まで提出いただく毎にJAが押印、コピー（控）し原本は返却いたします。

JA 確認欄				
提出回数	確認日	営農機課名	確認者	検印
1回目	年 月 日	() 営農機課		
2回目	年 月 日			
3回目	年 月 日			

2回目までは、原本は生産者へ返却



令和2年度定植 いちご 栽培管理日誌兼生産登録書

私は、栽培・防除指針を遵守していちご生産を行い、その内容全てを下記に記帳し報告します。
また、農業使用については、定められた基準を遵守します。出荷品の安全については一切の責任を負います。

住所	佐渡市		
氏名	印	TEL	-

1. 生産登録（品種で栽培管理・防除が異なる場合は別途記入ください）

ハウスNo	品種名	ハウス規模	定植本数	定植開始日（定植日数）	収穫開始予定日	作型
0	例 越後姫	5間×20間	2,200本	R2年9月30日（3日間）	R2年1月10日	高設・土耕
	越後姫	間×間	本	年 月 日（日間）	年 月 日	高設・土耕
		間×間	本	年 月 日（日間）	年 月 日	高設・土耕
		間×間	本	年 月 日（日間）	年 月 日	高設・土耕
		間×間	本	年 月 日（日間）	年 月 日	高設・土耕
		間×間	本	年 月 日（日間）	年 月 日	高設・土耕
	合計	a	本			

2. 本年度栽培

いちご苗の準備 (○を付ける)	苗を購入	JA佐渡より購入 ・ その他購入（購入先：）		
	自家採苗	採苗開始時期	平成	年 月 日
マルチ張り			年 月 日	備考
加温開始日			年 月 日	備考
頂果房開花期			年 月 日	備考
収穫開始日			年 月 日	備考
収穫終了日			年 月 日	備考

3. 施肥・土作り

施肥月日	肥料名	施肥量	倍率	備考
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				

※全面積の施肥、液肥、改良材、葉面散布剤の使用量を記入ください。

4. 農薬使用暦 (いちごの苗を購入された方は、購入苗の防除時期も記入をしてください。)

農薬は、あいうえお順に並んでいます。

殺菌剤名	使用量 (希釈倍率等)	使用時期 (収穫前)	使用回数 (以内)	薬剤を使用した場合は下記に日付を記載。				
				月日	月日	月日	月日	月日
ガッテン乳剤	5000倍	前日	2回	/	/			
カリグリーン	800倍	前日	—	/	/	/	/	/
サンヨール	500倍	前日	6回	/	/	/	/	/
サンリット水和剤	2000倍	前日	3回	/	/	/		
ジーファイン水和剤	1000倍	前日	—	/	/	/	/	/
シグナムWDG	2000倍	前日	2回	/	/			
スコア顆粒水和剤	2000倍	前日	3回	/	/	/		
ストロビーフロアブル	3000~5000倍	前日	3回	/	/	/		
トリフミン水和剤	3000倍	前日	5回	/	/	/	/	/
フルピカフロアブル	2000~3000倍	前日	3回	/	/	/		
プロパティフロアブル	3000~4000倍	前日	3回	/	/	/		
ベルコート水和剤	1000倍	育苗期	5回	/	/	/	/	/
ポリオキシンAL水和剤	1000倍	収穫開始14日前	3回	/	/	/		
モレスタン水和剤	4000倍	前日	2回	/	/			
ラリー乳剤	5000倍	前日	3回	/	/	/		
パンチョTF顆粒水和剤	2000倍	前日	2回	/	/			
ショウチノスケフロアブル	2000倍	前日	※2回	/	/	※チアゾリジン2回まで		
				/	/	/	/	/
				/	/	/	/	/
殺虫殺菌剤名	使用量 (希釈倍率等)	使用時期 (収穫前)	使用回数 (以内)	薬剤を使用した場合は下記に日付を記載。				
				月日	月日	月日	月日	月日
エコピタ液剤	100倍	前日	—	/	/	/	/	/
サンクリスタル乳剤	300倍	前日	—	/	/	/	/	/
				/	/	/	/	/
				/	/	/	/	/

殺虫剤名	使用量 (希釈倍率等)	使用時期 (収穫前)	使用回数 (以内)	薬剤を使用した場合は下記に日付を記載。				
				月日	月日	月日	月日	月日
アーデント水和剤	1000倍	前日	4回	/	/	/	/	
アニキ乳剤	2000倍	前日	3回	/	/	/		
アフーム乳剤	2000倍	前日	2回	/	/			
ウララDF	2000倍	前日	2回	/	/			
コロマイト水和剤	2000倍	前日	2回	/	/			
サンマイトフロアブル	1000~1500倍	収穫開始3日前	1回	/				
スターマイトフロアブル	2000倍	前日	2回	/	/			
スラゴ	5g/m ²	発生時	—	/	/	/	/	/
ダニサラバフロアブル	1000倍	前日	2回	/	/			
チェス顆粒水和剤	5000倍	前日	3回	/	/	/		
ディアナSC	2500~5000倍	前日	2回	/	/			
粘着くん液剤	100倍	前日	—	/	/	/	/	/
ハチハチフロアブル	1000倍	1番花の開花まで	1回	/				
ピラニカEW	2000倍	前日	2回	/	/			
ベストガード粒剤	1g/株	定植時	1回	/				
マイトコーネフロアブル	1000倍	前日	2回	/	/			
マッチ乳剤	1000~2000倍	前日	4回	/	/	/	/	
モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	前日	2回	/	/			
モベントフロアブル	500倍 25~50ml/株	育苗期後半	1回	/	※使用回数3回以内(灌注は1回以内)			
	2000倍	前日	※2回	/	/			
				/	/	/	/	/
				/	/	/	/	/
				/	/	/	/	/
				/	/	/	/	/
				/	/	/	/	/

一覧に品名の無い農薬を使用した場合は、空欄へ記入をお願いします。一覧に品名の無い農薬を使用する場合は、成分使用回数に注意をお願いします。防除暦を参考に、農薬散布をお願いしますが農薬を使用する場合は必ず登録内容・使用法を確認してから散布をお願いします。