

農薬使用暦

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、農薬を使用する場合は必ず登録内容・使用法を確認してから散布しましょう。

殺菌剤

摘要 病害	薬剤名	kg/10a又は 希釈倍率	使用時期 (収穫前)	使用回数 (以内)	薬剤を使用した場合は日付を記載					主な効果		左記の適用病害以外に 下記の病害にも有効です
					月日	月日	月日	月日	月日	予防	治療	
べと・黒斑・さび病	アミスター20フロアブル	2,000倍	3日	4回	/	/	/	/		○	○	黄斑・葉枯病
	ジマンダイセン水和剤 ※2	600倍	14日	3回	/	/	/			○		
	ヨネポン水和剤 ※4	500倍	7日	4回	/	/	/	/		○		軟腐病
	ダコニール1000	1,000倍	14日	3回	/	/	/			○		小菌核腐敗・葉枯病
黒斑・さび病	ストロビーフロアブル	2,000倍	7日	3回	/	/	/			○	○	黄斑病
べと病	アリエッティ水和剤 ※1	800倍	3日	3回	/	/	/			○		疫病
	リドミルゴールドMZ ※2	1,000倍	30日	3回	/	/	/			○	○	
さび病	サプロール乳剤	1,000倍	前日	5回	/	/	/	/	/	○	○	
	カリグリーン	800倍	前日	—	/	/	/	/	/	○		
	ベルコート水和剤	2,000倍	30日	3回	/	/	/			○		葉枯・黒斑病
	アフエットフロアブル	2,000倍	前日	2回	/	/				○		黒斑・小菌核腐敗病
	ラリー乳剤	4,000倍	14日	3回	/	/	/			○	○	
黒斑病	ポリオキシシンAL水和剤	1,000倍	14日	3回	/	/	/			○	○	ネギアザミウマ(発生初期)
	ロブラール水和剤	1,000倍	14日	3回	/	/	/			○		ボトリチス葉枯・小菌核腐敗・白絹病
軟腐病	オリゼメート粒剤	6kg/10a	30日	2回	/	/				○		
	スターナ水和剤	2,000倍	7日	3回	/	/	/			○		
	コサイド3000	2,000倍	—	—	/	/	/	/	/	○		
小菌核腐敗病	フロンサイド粉剤	15kg/10a	21日	2回	/	/				○		白絹病
	トップジンM水和剤	1,000倍	7日	3回	/	/	/			○	○	

- ※1 アリエッティ水和剤はヨネポン水和剤及びコサイド3000との混用及び近接散布は避ける。
- ※2 ジマンダイセン水和剤とリドミルゴールドMZを使用する場合は2薬品合わせて使用回数3回以内とする。
- ※3 アミスター20フロアブルとストロビードライフロアブルは浸透性を高める効果のある展着剤と混用しない。
- ※4 ヨネポン水和剤は夏期高温時は使用を避ける。
- ※5 ネキリエースKとカルホス粉剤は同一成分配合。播種時は1回以内、植付時は1回以内、植付後は2回以内の使用とする。
- ※6 スタークル顆粒水溶剤の散布分量は、セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0リットル)当り0.5リットルを灌注する。

基準となる薬剤を示してあります。下記以外の登録適用薬剤の使用は空欄へ記載下さい。

殺虫剤

摘要 害虫	薬剤名	kg/10a又は 希釈倍率	使用時期 (収穫前)	使用回数 (以内)	薬剤を使用した場合は日付を記載					主な効果		左記の適用害虫以外に 下記の害虫にも有効です
					月日	月日	月日	月日	月日	予防	治療	
ネキリムシ類	ネキリエースK ※5	3kg/10a	30日	2回	/	/						
	カルホス粉剤 ※5	6kg/10a	播種時又は定植時	2回	/	/						
ネギハモグリバエ ネギアザミウマ	ベストガード粒剤	6kg/10a	定植時	1回	/							
			収穫前日	3回	/	/	/					
	ダントツ粒剤	6kg/10a	播種・植付時	1回	/							
		3～6kg/10a	3日	4回	/	/	/					
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	播種・定植時	2回	/	/						
ネギハモグリバエ ネギアザミウマ	アクタラ顆粒水溶剤	1,000～2,000倍	3日	3回	/	/	/					
ネギアザミウマ シロイチモジヨトウ	ハチハチ乳剤	1,000倍	7日	2回	/	/						ネギコガ さび病・べと病
	プレオフロアブル	1,000倍	3日	4回	/	/	/					
	アニキ乳剤	1,000倍	3日	3回	/	/	/					ハモグリバエ類、ネギコガ
ネギアザミウマ	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	7日	3回	/	/	/					
	ウララDF	1,000～2,000倍	前日	3回	/	/	/					
シロイチモジヨトウ	トレボン乳剤	1,000倍	21日	2回	/	/						
	アフーム乳剤	1,000倍	7日	3回	/	/	/					ネギハモグリバエ
	マッチ乳剤	2,000倍	7日	3回	/	/	/					
	グレーシア乳剤	2000～3000倍	7日	2回	/	/						エ、 ネギコガ新期剤
シロイチモジヨトウ	アデオナ乳剤	2,000倍	7日	3回	/	/	/					
アザミウマ類 ネギコガ		3,000倍		2回	/	/						シロイチモジヨトウ
アザミウマ類 ネギコガ ネギハモグリバエ	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	5回	/	/	/	/	/			アブラムシ類 2000倍で定植後も 使用可能シロイチモジヨトウ
	アグロスリン乳剤	2,000倍	7日	1回	/							
タネバエ	プレバソフロアブル5	100倍	育苗期後半 ～定植当日	1回	/							
	スタークル顆粒水溶剤※6	50倍	定植前日 ～定植時	1回	/							ネギアザミウマ ネギハモグリバエ
	ダントツ粒剤	6kg/10a	植付時	1回	/							
ネダニ類	アプロードフロアブル	500～1,000倍 1～3リットル/m ² 株本灌注	14日	1回	/							クロバエキノコバエ類 ネキリムシ類
	フォース粒剤	9kg/10a	定植時									