

# 2020年度うめ 生産登録書・栽培管理日誌

## 日本一安心・安全でおいしい農産物の島 「佐渡」の実現を目指そう！

### 産地全体で取り組もう

1. 「安全・安心」は、一人ひとりの日々の作業記録
2. 「大玉でおいしいうめづくり」は、適期の管理
3. 「環境にやさしいうめづくり」は、土作りと適正な施肥と JA 佐渡防除暦に沿った病害虫防除の実践

#### ●提出についての注意事項

- 提出期日 1回目提出 5月末日（生産登録および防除確認）  
2回目提出 9月末日まで（最終防除終了後）  
※収穫前に提出・JA 確認がなければ出荷できませんのでご注意ください。
- 提出場所 最寄りの営農窓口まで提出をお願いいたします。  
※期日まで必ず提出くださるようお願いいたします！！


#### ●その他

提出いただいた個人情報は、JA 佐渡の生産指導のみに使用し、管理はJA 佐渡が責任を持って行います。

- 1 回目の提出は JA で内容を確認後押印し、原本を返却いたします。  
2 回目の提出は JA で内容確認後にコピーを返却いたします。

J A 確 認 欄				
提出回数	確認日	営農農機課名	確認者	検印
1 回目	年 月 日	( )		
2 回目	年 月 日	営農農機課		

1 回目は、原本を生産者へ返却してください。



# 2020年産 うめ 栽培管理日誌兼生産登録書

私は、栽培・防除指針を遵守して2020年産 うめ 生産を行い、その内容全てを下記に記帳し報告します。

また、農薬使用については、定められた基準を遵守します。出荷品の安全については一切の責任を負います。

住所：佐渡市	電話番号
2020年 月 日	印

### 1. 生産登録（品種で栽培管理・防除が異なる場合は別途記入ください）

生産登録				
品種名	面積(a)	植栽年	本数	特記事項
越の梅				
越の梅				
藤五郎				
藤五郎				
白加賀				
白加賀				
( )				
( )				
合計				

※特記事項については園地の所在地等を記入ください。

### 2. 施肥・土作り（令和元年の礼肥より記入ください）

施肥月日	肥料名	施肥量	施肥目的
/		kg	
/		kg	
/		kg	
/		kg	
/		kg	

※全面積の施肥、改良材、葉面散布剤の使用量を記入ください。

### 3. 栽培管理状況

管理作業			
整枝剪定	月 日～ 月 日	収穫（越の梅）	月 日～ 月 日
摘 果	月 日～ 月 日	収穫（藤五郎）	月 日～ 月 日
		収穫（白加賀）	月 日～ 月 日
草 刈	/ , / , / , /	収穫（ ）	月 日～ 月 日
夏 剪 定	月 日～ 月 日	初出荷予定日	月 日

※最終防除日から出荷できる日を確認ください！！

### 4. 気象災害など記入欄

月日	災害などの項目	被害面積

5. 農薬使用履歴

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。

下記に使用履歴を正確に記入してください。

回数	使用時期	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	収穫前日数	総使用回数	備考
臨時	休眠期	/	機械油乳剤95 ( )	100 L ( )	14倍	-	-	
1	3月上旬まで (休眠期)	/	石灰硫黄合剤 ( )	200 L ( )	7倍	発芽前	-	
2	開花直後 (落弁期)	/	Zボルドー ( )	350 L ( )	500倍	葉芽発芽前	-	
3	4月中旬 (満開10日~15日 後)	/	モスピラン顆粒水溶剤 ( )	350 L ( )	2,000倍	前日まで	3回以内	
			ベルコート水和剤 ( )		2,000倍	30日前まで	3回以内	
			マイコシールド ( )		1,500倍	21日前まで	4回以内	
臨時		/	スターナ水和剤 ( )	400 L ( )	1,000倍	7日前まで	3回以内	
4	4月下旬 幼果期	/	ダイソン水和剤34 ( )	400 L ( )	1,000倍	21日前まで	2回以内	
			オーソサイド水和剤80 ( )		800倍	21日前まで	3回以内	
5	5月上中旬 果実肥大期	/	ウララDF ( )	400 L ( )	4,000倍	7日前まで	2回以内	
			ペンコゼブフロアブル ( )		1,000倍	21日前まで	3回以内	
6	5月下旬~6月上旬 収穫前	/	スタークル顆粒水溶剤 ( )	400 L ( )	2,000倍	前日まで	3回以内	
			スコア顆粒水和剤 ( )		3,000倍	前日まで	3回以内	
7	7月上中旬 収穫後	/	スプラサイド乳剤40 ( )	400 L ( )	1,500倍	14日前まで	2回以内	収穫後
臨時	9月上旬 収穫後	/	スミチオン乳剤 ( )	400 L ( )	1,000倍	14日前まで	2回以内	収穫後
			ペンコゼブフロアブル ( )		1,000倍	21日前まで	3回以内	収穫後
		/	( )					
		/	( )					

※除草剤散布履歴

		使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率			備考
		/						
		/						

1回目は5月末日まで(収穫前)に必ず提出をお願いします。

2回目は10月末日(収穫後防除実施終了後)に必ず提出をお願いします。

※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

- ・農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。  
(農薬取締法により使用者責任が問われます。)
- ・散布圃場の周囲へのドリフト(飛散)に注意しましょう。(可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること)
- ・防除は生育や病害虫の発生予察に注意して適期におこないましょう。
- ・圃地環境(防風樹の整備・草刈りの徹底)をよくしましょう。
- ・散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。

2020年度  
うめ 生産登録・栽培管理日誌

