

2020年度さくらんぼ

生産登録書・栽培管理日誌

日本一安心・安全でおいしい

農産物の島「佐渡」の実現を目指そう！

産地全体で取り組もう

1. 「安全・安心」は、一人ひとりの日々の作業記録
2. 「大玉でおいしいさくらんぼづくり」は、適期の管理
3. 「環境にやさしいさくらんぼづくり」は、土作りと適正な施肥と JA 佐渡防除暦に沿った病虫害防除の実践

●提出についての注意事項（この用紙は2回提出いただきますので、保管に注意ください。）

- 提出期日 1回目 5月末日（生産登録および収穫前防除確認）
2回目 10月末日（最終防除終了後）

※1回目の提出・JA 確認がなければ出荷できませんのでご注意ください。

- 提出場所 最寄りの営農窓口まで提出をお願いいたします。

※1回目・2回目ともに、期日まで必ず提出くださるようお願いいたします！！

●その他

提出いただいた個人情報は、JA 佐渡の生産指導のみに使用し、管理はJA 佐渡が責任を持って行います。

1回目の提出はJA で内容を確認後押印し、原本を返却いたします。

2回目の提出はJA で内容確認後にコピーを返却いたします。



J A 確 認 欄					
提出回数	確認日	営農農機課名	確認者	検印	1回目は、原本を生産者へ返却してください。
1回目	年 月 日	()			
2回目	年 月 日	営農農機課			

2020年産 さくらんぼ 栽培管理日誌兼生産登録書

私は、栽培・防除指針を遵守してさくらんぼ生産を行い、その内容全てを下記に記帳し報告します。

また、農薬使用については、定められた基準を遵守します。出荷品の安全については一切の責任を負います。

住所：佐渡市	電話番号
生産者名： _____ 印	

1. 生産登録（品種で栽培管理・防除が異なる場合は別途記入ください）

生産登録				
品種名	面積(a)	植栽年	本数	特記事項

※特記事項については園地の所在地を記入ください。

2. 施肥・土作り（前年の礼肥より記入ください）

施肥月日	肥料名	施肥量	施肥目的
/		kg	
/		kg	
/		kg	
/		kg	
/		kg	

※全面積の施肥、改良材、葉面散布剤の使用量を記入ください

3. 栽培管理状況

管理作業			
整枝剪定	月 日～ 月 日	雨よけ被覆	月 日～ 月 日
摘蕾	月 日～ 月 日	反射マルチ	月 日～ 月 日
人工授粉	月 日～ 月 日	灌水	月 日～ 月 日
草刈	/ , / , / , /	収穫	月 日～ 月 日
摘果	月 日～ 月 日	初出荷予定日	___月___日

※最終防除日から出荷できる日を確認ください！！

4. 気象災害など記入欄

月日	災害などの項目	被害面積

5. 農薬使用履歴

基本的に別添の防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。

下記に使用履歴を正確に記入してください！！

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	収穫前日数	総使用回数	備考
臨時	/	ラビキラー乳剤 ()	()	200倍	休眠期	1	
1	/	ハーベストオイル ()	300 L ()	50倍	発芽前	-	
臨時	/	石灰硫黄合剤 ()	300 L ()	7倍	発芽前	-	
臨時	/	モスピラン顆粒水溶剤 ()	400 L ()	2,000倍	前日	1	
2	/	オーソサイド水和剤80 ()	400 L ()	800倍	3	5	
		トリフミン水和剤 ()		1,000倍	14		
臨時	/	ナリアWDG ()	500 L ()	2,000倍	前日	3	
3	/	サムコルフロアブル10 ()	500 L ()	2,500倍	前日	3	
		スコア顆粒水和剤 ()		2,000倍	前日		
4	/	スカシバコンL	40~100本 (本)	-	-	-	
5	/	スプラサイド水和剤 ()	500 L ()	1,500倍	7	3	
	/	フルーツセイバー ()		1,500倍	前日		
6	/	スタークル顆粒水溶剤 ()	500 L ()	2,000倍	前日	2	
	/	パスワード顆粒水和剤 ()		1,500倍	前日		
臨時	/	ダニサラバフロアブル ()	500 L ()	2,000倍	前日	2	
7	/	テルスターフロアブル ()	500 L ()	4,000倍	前日	2	
	/	ナリアWDG ()		2,000倍	前日		
臨時	/	ダントツ水溶剤 ()	500 L ()	2,000倍	前日	2	
	/	インダーフロアブル ()		5,000倍	前日		
臨時	/	スカウトフロアブル ()	500 L ()	3,000倍	前日	2	
	/	ファンタジスタ顆粒水和剤 ()		3,000倍	前日		
臨時	/	スタークル顆粒水溶剤 ()	500 L ()	2,000倍	前日	2	
	/	フルーツセイバー ()		1,500倍	前日		
8	/	マイトコーネフロアブル ()	500 L ()	1,000倍	14	1	
	/	チオノックフロアブル ()		500倍	21		
9	/	チオノックフロアブル ()	500 L ()	500倍	21	5	
10	/	オキシラン水和剤 ()	500 L ()	600倍	収穫後~落葉期	3	
臨時	/	コロマイト乳剤 ()	500 L ()	1,000倍	7	1	
11	/	オーソサイド水和剤80 ()	500 L ()	800倍	3	5	

※除草剤散布履歴

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率		備考
	/					
	/					

※その他農薬散布履歴

回数	使用月日	使用農薬	散布量/10a	希釈倍率	収穫前日数	総使用回数	備考
	/						

※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

- ・ 農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。
- ・ 散布圃場の周囲へのドリフト(飛散)に注意しましょう。(可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること) 2020年度
- ・ 防除は生育や病害虫の発生予察に注意して適期におこなひましょう。
- ・ 圃地環境(防風樹の整備・草刈りの徹底)をよくしましょう。
- ・ 散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。

さくらんぼ防除日誌

