

2020年度すいか

栽培管理日誌

日本一安心・安全でおいしい農産物の島「佐渡」
の実現を目指そう！

産地全体で取り組もう

1. 「安全・安心」は、一人ひとりの日々の作業記録
2. 「大玉でおいしいすいかづくり」は、適期の管理
3. 「環境にやさしいすいかづくり」は、土作りと適正な施肥と JA 佐渡防除暦に沿った病虫害防除の実践

●提出についての注意事項

- 提出期日 出荷前
- 提出場所 最寄りの営農窓口まで提出をお願いいたします。

●その他

提出いただいた個人情報は、JA 佐渡の生産指導のみに使用し、管理は JA 佐渡が責任を持って行います。（提出いただいた際に JA が押印、コピー（控）を返却いたします。）



JA 確認欄				
確認日	営農農機課名	確認者	検印	コピー を生産 者へ返却
年 月 日	() 営農農機課			

2020年産 すいか 栽培管理日誌

私は、栽培・防除指針を遵守して2020年産 すいか 生産を行い、
その内容全てを下記に記帳し報告します。

また、農薬使用については、定められた基準を遵守します。出荷品の安全については一切の責任を負います。

住所：佐渡市	電話番号
2020年 月 日	印

1. 作付け

品種名	面積(a)	定植日		本数	特記事項
祭りばやし777		/	/		
姫甘泉		/	/		
		/	/		

※特記事項については園地の所在地を記入ください。

2. 施肥・土作り

施肥目的	施肥月日	肥料名	施肥量	備考
堆肥	/	JA有機	kg	
	/		kg	
石灰	/	苦土石灰	kg	
	/	カキガラ	kg	
元肥	/	LP-U西瓜・メロン	kg	
	/	コージくん5号	kg	
	/	コージくん5号本生	kg	
	/	ようりん	kg	
追肥	/	くみあい液肥	kg	
	/	燐硝安加里	kg	
	/		kg	

※全面積の施肥、改良材、葉面散布剤の使用量を記入ください

3. 栽培管理状況

管理作業					
換気開始	月 日～	月 日	ツルの整理	月 日～	月 日
交配期間	月 日～	月 日	トンネル除覆	月 日～	月 日
玉直し	月 日～	月 日			
収穫予定日	大玉 月 日開始予定		収穫予定日	小玉 月 日開始予定	

※最終防除日から出荷できる日を確認ください！！

4. 気象災害など記入欄

月日	災害などの項目	被害面積

※裏面には防除履歴の記入欄がありますので記入ください

5. 農薬使用履歴

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。

下記に使用履歴を正確に記入してください！！

対象病虫害	薬剤名	希釈倍率 又は量	使用時期 (収穫前)	使用回数 (以内)	薬剤を使用した場合は下記に日付を記載					主な効果		
					使用月日	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日	予防	治療	
殺菌剤	菌核病 つる枯病 炭疽病	ベルコート水和剤	1,000倍	前日	4回	/	/	/	/	/	○	
	つる枯病 炭疽病	オキシラン水和剤	500倍	14日	5回	/	/	/	/	/	○	
		アミスター20フロアブル	2,000倍	前日	4回	/	/	/	/	/	○	○
	つる枯病 炭疽病	ポリベリン水和剤	1,000倍	前日	4回	/	/	/	/	/	○	○
		テーク水和剤	600倍	7日	5回	/	/	/	/	/	○	○
		スコア顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回	/	/	/	/	/	○	○
		シグナムWDG	2,000倍	前日	3回	/	/	/	/	/	○	
	炭疽病 ベと病 つる枯病 疫病 褐斑細菌病	ジマンダイセン水和剤	500倍	7日	7回	/	/	/	/	/	○	
菌核病 つる枯病 炭疽病	ベンレート水和剤	2,000倍	前日	5回	/	/	/	/	/	○	○	
殺虫剤	ケラ・ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a	播種時 または 定植時	2回	/	/	/	/	/		
	アブラムシ類	ベストガード粒剤	1~2g/株	定植時	1回	/	/	/	/	/		
		ウララDF	2,000倍~ 4,000倍	前日	2回	/	/	/	/	/		
	オオタバコガ ハモグリバエ	プレバソンフロアブル	2,000倍	前日	3回	/	/	/	/	/		
	オオタバコガ ハダニ類 ※	コテツフロアブル	2,000倍	前日	2回	/	/	/	/	/		
	アブラムシ ハダニ類 ※	アーデント水和剤	1,000倍	前日	5回	/	/	/	/	/		
		サンマイトフロアブル	1,000倍	3日	2回	/	/	/	/	/		
		テルスター水和剤	1,000倍	前日	4回	/	/	/	/	/		
	ハダニ類 ※	コロマイト乳剤	1,000倍	7日	2回	/	/	/	/	/		
		ピラニカEW	2,000倍	3日	1回	/	/	/	/	/		
ダニサラバフロアブル		1,000倍	前日	2回	/	/	/	/	/			
除草剤	マルチ被覆前	クレマート乳剤	薬剤 400ミリリットル/10a	定植・ マルチ前	1回	/	/	/	/	/		
	追肥・しきわら前 畝間土壌表面散布	トレファノサイド乳剤	薬剤 300ミリリットル/10a	45日 (トンネル除去前)	2回	/	/	/	/	/		

⚠ 農薬使用時の注意

※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

※同様に本記載以外の薬剤を使用する場合は別途定められる「同一成分を含む薬剤の総使用回数」にご注意下さい。

※農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。

※散布圃場の周囲へのドリフト(飛散)に注意しましょう。(可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること)

※防除は生育や病虫害の発生予察に注意して適期におこないましょう。

※園地環境(防風樹の整備・草刈りの徹底)をよくしましょう。

※散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。

※幼果期の間は葉害の恐れがあるため、薬剤散布はさける。

※ダニ剤は抵抗性を避ける為に同一薬剤の連用は避ける。