

2021年産 西洋なし 栽培管理日誌兼生産登録書

私は、栽培・防除指針を遵守して令和2年産 西洋なし 生産を行い、
その内容全てを下記に記帳し報告します。

また、農薬使用については、定められた基準を遵守します。出荷品の安全については一切の責任を負います。

住所：佐渡市
2021年 月 日

印

1. 生産登録 (品種で栽培管理・防除が異なる場合は別途記入ください)

生産登録				
品種名	面積(a)	植栽年	本数	特記事項
ル・レクチェ				
コミス				
コミス				
()				
()				
合計				

※特記事項については圃地の所在地を記入ください。

2. 本年度計画数

	令和3年度 4kgDB換算 出荷計画数	令和3年度 袋掛け数	令和2年度 4kgDB換算 出荷実績
1回目提出 (袋かけ終了後)	箱	袋	

3. 施肥・土作り (令和元年の礼肥より記入ください)

施肥月日	肥料名	施肥量	施肥目的
/		kg	

※全面積の施肥、改良材、葉面散布剤の使用量を記入ください

4. 栽培管理状況

管理作業			
整枝剪定	月 日～ 月 日	摘果	月 日～ 月 日
芽かき	月 日～ 月 日	袋かけ	月 日～ 月 日
受粉	月 日～ 月 日	収穫	月 日～ 月 日
草刈	/ , / , / , /		月 日～ 月 日
	月 日～ 月 日	初出荷予定日	__月__日

※最終防除日から出荷できる日を確認ください！！

5. 気象災害など記入欄

月日	災害などの項目	被害面積

2021 年度西洋なし

生産登録書・栽培管理日誌

日本一安心・安全でおいしい農産物の島「佐渡」
の実現を目指そう！

産地全体で取り組もう

1. 「安全・安心」は、一人ひとりの日々の作業記録
2. 「大玉でおいしい洋梨づくり」は、適期の管理
3. 「環境にやさしい洋梨づくり」は、土作りと適正な施肥と JA 佐渡防除層に沿った病害虫防除の実践

●提出についての注意事項 (この用紙は2回提出いただきますので、保管に注意ください。)

- 提出期日 1回目提出 袋掛け終了後 6月21日まで
2回目提出 最終防除終了後 10月15日まで
各提出・JA 確認がなければ出荷できませんのでご注意ください。
- 提出場所 最寄りの営農窓口まで提出をお願いいたします。

※1回目・2回目ともに、期日まで必ず提出くださるようお願いいたします！！

●その他

提出いただいた個人情報は、JA 佐渡の生産指導及び、農業共済組合への情報提供のみに使用し、

管理はJA 佐渡が責任を持って行います。(提出いただく毎にJA が押印、コピー (控) し原本

6. 農薬使用履歴

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。

下記に使用履歴を正確に記入してください！！

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	収穫前日数
1	/	ベフラン液剤25 ()	270 L ()	250倍	休眠期/1回
2	/	デランフロアブル ()	300 L ()	1000倍	60日/4回
		ダーズバンDF ()		3000倍	30日/3回
3	/	カスケード乳剤 ()	300 L ()	2000倍	14日/2回
		ベルコート水和剤 ()		1000倍	14日/5回
4	/	テーク水和剤 ()	300 L ()	600倍	30日/3回
5	/	チオノックフロアブル ()	300 L ()	500倍	30日/5回
6	/	デランフロアブル ()	300 L ()	1000倍	60日/4回
		サイアノックス水和剤 ()		1000倍	45日/3回 (無袋)
7	/	デランフロアブル ()	300 L ()	1000倍	60日/4回
		ダントツ水溶剤 ()	300 L ()	2000倍	前日/3回
8	/	ポリキャブ水和剤 ()	350 L ()	1000倍	7日/5回
9	/	キノンドーフロアブル ()	350 L ()	1000倍	3日/9回銅剤
		ダイアジノン水和剤34 ()		1000倍	14日/6回
	/	コンフューザーN	50~200本 (本)		
10	/	キノンドーフロアブル ()	350 L ()	1000倍	3日/9回銅剤
		テルスターフロアブル ()		3000倍	前日/2回
11	/	チオノックフロアブル ()	450 L ()	500倍	30日/5回
12	/	フロンサイドSC	450 L ()	2000倍	30日/1回
		ダイアジノン水和剤34 ()		1000倍	14日/6回
13	/	パスポート顆粒水和剤 ()	450 L ()	1000倍	30日/3回
14	/	ポリキャブ水和剤 ()	450 L ()	1000倍	7日/5回
		サイアノックス水和剤 ()		1000倍	45日/3回 (無袋)

※ 使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

- ・ 農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。
- ・ 散布圃場の周囲へのドリフト(飛散)に注意しましょう。(可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること)
- ・ 防除は生育や病害虫の発生予察に注意して適期におこないましょう。
- ・ 圃地環境(防風樹の整備・草刈りの徹底)をよくしましょう。
- ・ 散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	収穫前日数
15	/	キノンドーフロアブル ()	450 L ()	1000倍	3日/9回銅剤
					3日/2回
16	/	キノンドーフロアブル ()			3日/9回銅剤
		ダニサラバフロアブル ()			前日/2回
17	/	キノンドーフロアブル ()	400 L ()	1000倍	3日/9回銅剤
18	/	オーソサイド水和剤80 ()	400 L ()	1000倍	3日/9回
		スカウトフロアブル ()		2000倍	前日/5回
19	/			1000倍	14日/5回
20	/			1000倍	3日/9回銅剤
				4000倍	前日/2回
	/			1000倍	収穫開始21日~4日前/2回
21	/			3000倍	前日/3回
22	/			30倍	-

※除草剤散布履歴

使用月日		希釈倍率	備考
/			
/			

J A 確 認 欄					
提出回数	確認日	営農農機課名	確認者	検印	1 回目は、原本を生産者へ返却してください。
1 回目	年 月 日	()			
2 回目	年 月 日	営農農機課			

1 回目は6月21日(袋掛け終了後)、2 回目は10月15日(最終防除終了後)までに必ず提出をお願いします。