

令和2年8月4日

おけさ柿生産者の皆様へ

J A佐渡営農事業部

おけさ柿中央選果場管内におけるカメムシ発生増加に伴う 農薬防除対応について

みだしの件につきまして、各地・各品目でカメムシ発生が増加している事から8月～9月（最終防除）までのおけさ柿の防除を下記のとおり対応をお願いします。

なお、カメムシ防除の間隔が空かないようにするため7回目の防除実施時期は6回目を7月下旬の前半で実施している方は8月上旬に実施し7月下旬の後半で防除している方は8月中旬に実施するように対応をお願いします。

記

1 カメムシ対策防除暦変更点

- (1) 8月下旬にカメムシ対策にキラップフロアブルを単用散布する。
- (2) 9月上旬の殺虫剤をキラップフロアブルからテルスター水和剤に変更しますので、使用回数に注意をお願いします。
- (3) 9月中旬にカメムシ対策にスタークル顆粒水溶剤を単用散布する。
※手持ち薬剤を活用できるように計画しましたので使用回数に注意をお願いします。

※ハスモンヨトウが多発する場合は、サムコルフロアブル10を5,000倍（前日/3回）で単用散布する。（防除暦とおり）

【裏面に防除暦の表があります】

2 防除暦表

回数	散布時期	主な対象 病害虫	薬剤名又は展着剤	散布濃度	収穫前 使用時期	使用 回数	水100L あたり薬量	10a 散布 量 ¹⁾ 手散布 (²⁾ はSS散布
7	8 月上 中旬	カキ/ハタムシガ ¹⁾ カムシ類 チャノキイロアザミウマ	スタークル 顆粒水溶剤	2,000倍	前日	3	50 g	400 (350)
		落葉病 すず点病 炭疽病	オーソサイド 水和剤80	1,000倍	7日	5	100 g	
臨時	8 月下旬	カムシ類 アザミウマ類	キラップ フロアブル	2,000倍	7日	2	50 ml	400 (350)
8	9 月上旬	カムシ類 チャノキイロアザミウマ	テルスター 水和剤 ※1	2,000倍	14日	2	50 g	400 (350)
		落葉病 炭疽病 すず点病 うどんこ病	トップジンM 水和剤	1,500倍	前日	6	66 g	
臨時	9 月中旬	カキ/ハタムシガ ¹⁾ カムシ類 チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ	スタークル 顆粒水溶剤	2,000倍	前日	3	50 g	400 (350)

※1 9月下旬の8回目防除はテルスター水和剤からテルスターフロアブル 6,000倍(3日/2回)に変更も可能です。

※薬剤の総使用回数に注意をお願いします。

※ご不明な点は、各営農農機課おけさ柿担当者までお問い合わせください。

以上

お問い合わせ先							
J A 佐渡各営農農機課 T E L							
相 川	74-2061	新 穂	22-3137	小 木	86-3711		
佐 和 田	57-2522	畑 野	66-3133	赤 泊	87-3133		
金 井	63-3217	真 野	55-1030	両 津	27-5119		
営農事業部営農企画課				63-3106			