

《アスパラガス情報》

1. 台風通過後の管理について

- ・台風により倒伏被害を受けて折れてしまった茎は、根元から抜き取って下さい。
- ・防除について（下記参照）
 - ①9月上旬防除を未実施の場合は、
9月上旬（ロブラール水和剤）と中旬（ベンレート水和剤）を入れ替えて防除。
 - ②すでに9月上旬防除を実施した場合は、
アミスター20フロアブル（収穫前日まで 2,000倍）での臨時防除実施。

①9月上旬防除を未実施の場合

月	旬	対象病害虫	用途	薬剤名	使用方法 (希釈倍率)
9月	上旬	茎枯病	殺菌	ベンレート水和剤	2000倍
		ハスモンヨトウ ヨトウムシ	殺虫	アファーム乳剤	2000倍
	中旬	茎枯病	殺菌	ロブラール水和剤	2000倍
	下旬	茎枯病	殺菌	コサイド3000	2000倍

②9月上旬防除を実施した場合

月	旬	対象病害虫	用途	薬剤名	使用方法 (希釈倍率)
9月	臨時	茎枯病 斑点病	殺菌	アミスター20 フロアブル	2000倍
	中旬	茎枯病	殺菌	ベンレート水和剤	2000倍
	下旬	茎枯病	殺菌	コサイド3000	2000倍

- ※農薬の収穫前日数や使用回数をご確認の上、使用下さい。
- ・マイカー線のゆるみを直し、倒伏防止対策を実施して下さい。

2. 今後の管理について

2年目以降

- ・萌芽がなくなるまで、収穫を実施して下さい。（稲刈り期間中も収穫。）
- ・株が自然に黄化するまで、病害虫防除を実施して下さい。

1年目

- ・翌年春どりを実施するための秋（茎葉刈取時）の生育目標

草丈 150cm 各株に8~10mmの茎が3本以上立茎している。

目標を確保するために、倒伏防止・防除等の実施をお願いします。

3. 今後の予定について

- ・10月に刈取指導会を実施予定です。

※毎年、親茎刈取前に株の栄養分を把握するために株調査を実施しております。
茎枯れ病により早期刈取を予定されている方は、事前に各支店担当または園芸振興課までご連絡をお願いいたします。

お問い合わせ
JA佐渡園芸振興課
TEL 63-3101