

茎数急増！ 「ただちに」中干し実施！

田植えの早いほ場等では、すでに過剰生育傾向です。
当面、高温予想のため、ただちに中干しと溝切りを行いましょう。

1 6月20日現在のコシヒカリ生育状況 (拠点9地点平均、移植日平均5月6日)

● 茎数(多) ※ ほ場間差が大きい

区分	本年値	目標値 (栽培加齢 [※] -生育目標比・差)	前年値 (前年値比・差)
草丈 (cm)	35	37 (94%)	39 (90%)
茎数 (本/m ²)	508 ※(396)	410 (124%)	478 (106%)
葉数 (葉)	9.0	8.7 (+0.3)	9.4 (-0.4)
葉色 (SPAD値)	40.4	39.0 (+1.4)	40.5 (-0.1)

※茎数の()内数値は、5月7日以降田植えの平均値

2 コシヒカリの管理ポイント

- (1) 5月上旬植えは、「強めに中干し」する(大ヒビにならない程度)。
- (2) 5月中旬植えは、「ただちに」中干しを開始する。
- (3) 5月下旬植えは、田植え後30日で中干しを開始する。
- (4) 中干し後、地固めができたなら、溝切りを「必ず実施」する。

3 その他の管理ポイント

- (1) カメムシ対策として、一斉草刈り(期間:6/21~30)を実施する。
- (2) いもち病の発生源となるので、補植苗はただちに除去する。