

中干しを確実に実施しましょう！

本年は、田植え日や地域によって生育に大きな差が見られます。6 月中旬からの低温と日照不足で、生育の速度は遅くれています。落水していないほ場では、ワキの発生が多く見られます。

1 6 月 19 日現在の生育状況（品種：コシヒカリ 拠点ほ場 9 か所の平均）

●茎数・葉色は目標値並。草丈はやや短く葉数は遅れています、地域差は大きい。

	本年値 (分施体系)	前年値 (前年比・差)	目標値 (カインダ [®] -生育目標値比・差)	本年値 (*一発体系)
草丈 (cm)	33	32 (103%)	37 (89%)	36
茎数 (本/m ²)	391	405 (97%)	410 (95%)	251
葉数 (葉)	7.9	8.6 (-0.7 葉)	8.7 (-0.8 葉)	7.8
葉色 (SPAD 値)	37.5	41.1 (-3.6)	39.0 (-1.5)	39.0

**一発：H30 から基肥一発体系(全量基肥施肥) 数値を参考として掲載します

2 今後の管理ポイント

- (1) 中干しに入っていないほ場は、直ちに中干しを開始し、溝切りを行いましょう。
- (2) 出穂の 1 か月前（7 月上旬まで）には、中干しを終え間断かん水に移りましょう。
- (3) 6 月 23 日（土）から「カメムシ対策草刈り期間」が始まります。畦畔の草刈りを実施してください。
- (4) こまめな水分補給で「熱中症」の予防を行いましょう。