

間断かん水で根を元気にしましょう

- ・ 茎数が過剰で葉色が急に淡くなっています。根の健全化を図る水管理に努めましょう。
- ・ 出穂期は「平年より1日程度早い」と予想されます。

1 6月29日現在のコシヒカリ生育状況 (拠点9地点平均、移植日平均5月7日)

葉数 (やや早い) 茎数 (多) 葉色 (やや淡)

区分	本年値	目標値 (加齢 [※] -生育目標比・差)	前年値 (前年値比・差)
草丈 (cm)	49	49 (100%)	53 (92%)
茎数 (本/m ²)	597	500 (119%)	612 (98%)
葉数 (葉)	10.4	10.0 (+0.4)	10.0 (+0.4)
葉色	SPAD	37.9	39.0 (-1.1)
	葉色板	3.9	4.3 (-0.4)

2 コシヒカリの管理ポイント

- (1) 茎数過剰のほ場は中干しを継続しましょう。中干しは大ヒビが入らない程度にし、出穂期30日前までには水を入れましょう。
- (2) 中干し直後は浅水の間断かん水を行ない、徐々に飽水管理に移行しましょう。
- (3) ほ場毎の生育差が大きいため、幼穂や下位節間の伸長をこまめに観察し、生育に合わせた穂肥の適期を判断しましょう。

3 その他の管理ポイント

早生品種は、まもなく幼穂形成期です。分施では、幼穂長を確認し、1回目の穂肥を遅れずに施用しましょう。