

コシヒカリ

5割減減100%

# 有利販売のための資材統一にご協力ください！！

\*\*\*ガイドライン表示可能資材の使用について\*\*\*

平成22年9月 JA佐渡営農部

JA佐渡では、平成24年を目標として、「コシヒカリ5割減減栽培100%」をめざしています。

5割以上の減減栽培で生産された佐渡米を有利販売につなげるために、「特別栽培米」として使用資材の表示（ガイドライン表示）が可能な米が求められています。

そのためには、使用資材の統一が必要となります。

つきましては、いま、平成23年用の肥料・農薬の予約注文の取りまとめ時期を迎えています。JA佐渡ガイドライン表示資材のご利用を是非ご検討くださるようお願いいたします。

## 平成23年度 JA佐渡ガイドライン表示資材

下記ガイドライン表示資材の中から栽培上必要なものをご使用ください。

栽培条件がそれぞれ異なるため、ガイドライン資材の利用を出荷の条件とするものではありません。

網掛けの部分が22年度と異なる薬剤です。

項目	コシヒカリ5割減のガイドライン基準防除例(9成分回数以内)	
	薬剤名(成分数)	備考
種子消毒	温湯消毒(0)	・塩水選の実施。 (JAの配布する種子は温湯消毒済み種子です) ・温湯消毒を行わない場合は、生物農薬を使用する。 エコホープDJ、タフブロック(0)
箱消毒	<b>イチバン</b> (0)	
育苗	<b>カスミン粒</b> (0)	・細菌性病害対策として、特に温度管理に注意する。
初期除草剤	[ <b>ソルネット粒</b> ](1)	・代かきから田植えまでの期間が、10日以上あく場合のみ使用を検討する。エリジャン乳剤(同一成分)も使用できます。
初中期一発除草剤	<b>忍シバ'</b> (3)	・コナギに有効な薬剤です。 2成分剤のサンシャインも使用できます。
特殊雑草防除	[ <b>モゲトン粒</b> ](1)	アオミドロ・表層はく離の多発時にのみ使用する。
初期害虫防除	<b>ダントツ箱粒剤</b> (1)	ワンリード箱粒剤08も使用できます。(同一成分で低薬量)
稲こうじ病・紋枯病	[ <b>モンガリット粒剤</b> ](1)	・稲こうじ病のみ防除する場合は、撒粉ホルドー粉剤DL(0)を使用してもよい。
カメムシ防除	<b>スタークル</b> (無人へり含む)(1)	・畦畔草刈の徹底。  <草刈の間隔は3週間以上あけないこと>
	<b>ダントツ剤</b> (1)	
成分回数合計	6[9]	※ [ ]書きの資材は、必要に応じて使用することとする。

佐渡市認証米としてカントリーに出荷する場合は、必ず記載されている農薬を使用してください。