

5. 農薬使用履歴

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。
 下記に使用履歴を正確に記入してください！！

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	収穫前日数	総使用回数	備考
1	/	コサイドボルドー ()	200L()	500倍			発芽前まで
2	/	カスミンボルドー ()	200L()	1,000倍			
		クレフノン ()		200倍			
3	/	アグリマイシン-100 ()	200L()	1,000倍			落花期まで
4	/	アグリマイシン-100 ()	300L()	1,000倍			落花期まで
5	/	スプラサイド水和剤 ()	300L()	1,500倍			
		トップジンM水和剤 ()		1,000倍			
6	/	ロブラール水和剤 ()	300L()	1,500倍			
7	/	ダコニール1000 ()	300L()	1,000倍			
8	/	スプラサイド水和剤 ()	300L()	1,500倍			
臨時	/	トップジンM水和剤 ()	300L()	1,000倍			
臨時	/	コサイドボルドー ()	300L()	500倍			収穫及び剪定後防除
臨時	/	機械油乳剤95 ()	250L()	14倍			収穫及び剪定後防除
	/	()					
	/	()					
	/	()					
	/	()					
	/	()					

10月10日までにJAに必ず提出ください。

JA確認月日	確認者印
月 日	印
月 日	印

- ※農薬の飛散に充分注意してください。
- ※農薬使用については、濃度・散布量に注意！！
- ※他の作物への農薬付着に細心の注意を払いましょう。

■施肥量の基準 (10a 当たり)

施肥時期	肥料名	施肥量 kg	施肥量 (成分)			備考
			窒素	燐酸	加里	
11月中旬	ニュー	120	9.6	9.6	9.6	堆肥は年間 2,000kg以上
6月中旬	果樹	60	4.8	4.8	4.8	
9月上旬	ユーキ	30	2.4	2.4	2.4	
12~2月	粒状セルカ	150				かきがら石灰
合	計		16.8	16.8	16.8	

※除草剤散布履歴

	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率		備考
	/					
	/					
	/					

※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

- ・農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。
- ・散布圃場の周囲へのドリフト(飛散)に注意しましょう。(可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること)
- ・防除は生育や病害虫の発生予察に注意して適期におこないましょう。
- ・圃地環境(防風樹の整備・草刈りの徹底)をよくしましょう。
- ・散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。

