

**5. 農薬使用履歴**

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。

下記に使用履歴を正確に記入してください！！

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	収穫前日数	総使用回数	備考
1	/	石灰硫黄合剤 ( )	250 L ( )	10倍			
2	/	ハーベストオイル ( )	300 L ( )	200倍			
		ダースバンDF ( )		3000倍			
		ペフラン液剤25 ( )		1500倍			
3	/	インダーフロアブル ( )	300 L ( )	5000倍			
		ファイブスター顆粒水和剤 ( )		1000倍			
4	/	スコア顆粒水和剤 ( )	400 L ( )	3000倍			
		カスケード乳剤 ( )		2000倍			
		クレフノン ( )		80倍			
5	/	デランフロアブル ( )	400 L ( )	2000倍			
		ダースバンDF ( )		3000倍			
		ダニゲッターフロアブル ( )		2000倍			
		クレフノン ( )		80倍			
6	/	ナリアWDG ( )	500 L ( )	2000倍			
		バリアード顆粒水和剤 ( )		2000倍			
		クレフノン ( )		80倍			
7	/	オキシラン水和剤 ( )	500 L ( )	500倍			
		オリオン水和剤40 ( )		1000倍			
		クレフノン ( )		80倍			
8	/	ビオネクト ( )	500 L ( )	1000倍			
		バリアード顆粒水和剤 ( )		2000倍			
9	/	ナリアWDG ( )	500 L ( )	2000倍			
		ダイジノン水和剤34 ( )		1000倍			
臨時	/	スプライト水和剤 ( )	500 L ( )	1500倍			
10	/	ペフラン液剤25 ( )	500 L ( )	1500倍			
		オリオン水和剤40 ( )		1000倍			
11	/	オーソサイド水和剤80 ( )	500 L ( )	800倍			
		カネイトフロアブル ( )		1000倍			
		モスビラン水溶剤 ( )		4000倍			
12	/	サイノックス水和剤 ( )	500 L ( )	1000倍			
13	/	フリントフロアブル25 ( )	500 L ( )	3000倍			
		ロディー水和剤 ( )		1500倍			
臨時	/	モスビラン水溶剤 ( )	500 L ( )	4000倍			
14	/	トップジンM水和剤 ( )	500 L ( )	1500倍			
		ロディー水和剤 ( )					
15	/	ナリアWDG ( )	500 L ( )	2000倍			

JAに提出ください！！  
 1回目は8月末頃（早生収穫前）に必ず提出をお願いします。  
 2回目は11月下旬（ふじ収穫前）に必ず提出をお願いします。

※除草剤散布履歴			
使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率
/			
/			
/			

(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

確認欄		
1回目	月 日	印
2回目	月 日	印



※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

- ・ 農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。
- ・ 散布圃場の周囲へのドリフト（飛散）に注意しましょう。（可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること）
- ・ 防除は生育や病害虫の発生予察に注意して適期におこなひましょう。
- ・ 圃地環境（防風樹の整備・草刈りの徹底）をよくしましょう。
- ・ 散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。