

5. 農薬使用履歴

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。
 下記に使用履歴を正確に記入してください。

回数	使用時期	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	収穫前日数	総使用回数	備考
臨時	休眠期	/	機械油乳剤95 ()	100L ()	14倍		—	
1	12月中旬～ 3月上旬	/	石灰硫黄合剤 ()	350L ()	7倍	発芽前	—	
2	開花直後	/	I C ボルドー66D ()	350L ()	50倍	葉芽発芽前	—	
3	4月中旬 満開10～20日後	/	ダイジノ水和剤34 ()	350L ()	1,000倍	21日前まで	2回以内	
			マイコシルト水和剤 ()		1,500倍	21日前まで	4回以内	
4	5月上中旬 果実肥大期	/	モスピラン水溶剤 ()	400L ()	5,000倍	前日まで	3回以内	
			スコア顆粒水和剤 ()		3,000倍	7日前まで	3回以内	
臨時	5月下旬	/	スターナ水和剤 ()	400L ()	1000倍	7日前まで	3回以内	
	6月に入らない	/	スプラサイド乳剤40 ()	400L ()	1500倍	14日前まで	2回以内	
6	5月下旬 収穫前	/	オーシャイン水和剤 ()	400L ()	3,000倍	前日まで	3回以内	
7	収穫後	/	スタークル顆粒水溶剤 ()	400L ()	2,000倍	前日まで	3回以内	収穫後
臨時	収穫後	/	スミチオン乳剤 ()	400L ()	1,000倍	14日前まで	2回以内	収穫後
			オーソサイド水和剤80 ()		800倍	21日前まで	3回以内	収穫後
		/	()					
		/	()					

※JAへ出荷前に提出してください。

* 確認欄

JA確認月日	確認者印
月 日	印

※除草剤散布履歴

	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率		備考
	/					
	/					

※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

- 農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。(農薬取締法により使用者責任が問われます。)
- 散布圃場の周囲へのドリフト(飛散)に注意しましょう。(可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること)
- 防除は生育や病害虫の発生予察に注意して適期におこないましょう。
- 園地環境(防風樹の整備・草刈りの徹底)をよくしましょう。
- 散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。

