

# 遅れないように中干し実施！

5月中旬田植えの多くでも、既に中干し開始適期を迎えています。生育めやすに達したら中干しを開始しましょう。

6月11日に梅雨入りしたとみられます。今後、まとまった雨が降る前に中干し・溝切りを行いましょう。

## 1 6月20日現在のコシヒカリ生育状況 (拠点9地点平均、移植日平均5月9日)

草丈：やや長、茎数：並、葉数：並、葉色：並

区分	本年値	目標比・差	前年比・差
草丈 (cm)	40	109%	115%
茎数 (本/m <sup>2</sup> )	413	101%	81%
葉数 (葉)	8.9	+0.2	-0.1
葉色 (SPAD値)	39.6	+0.6	-0.8

## 2 コシヒカリの管理ポイント

- (1) 5月中旬以降田植えで中干し未実施の場合、生育めやすの茎数(1株15~18本)を確保したら、すぐに中干しを開始する。
- (2) 中干し開始後、地固めができたなら、溝切りを「必ず実施」する。
- (3) 乾かし過ぎて大きなヒビが入ると根を傷めるので、田面の状態に注意し、大きなヒビにならないよう走り水かん水を行う。

## 3 その他の管理ポイント

- (1) カメムシ対策として、一斉草刈り(期間:6/20~29)を実施する。
- (2) いもち病の発生源となるので、補植苗はただちに除去する。