

水稻の硫黄欠乏症対策と初期生育促進に！

育苗箱施用に適した細粒タイプ

イナズマS

正味：5kg

稲に
電撃！

田植え後30～40日後

田んぼにこんな症状ありませんか？

× 茎数 が増えない

× 草丈 が伸びない

× 下葉が 黄化 する

その症状！

硫黄 (S) 欠乏

かもしれません！

★硫黄(S)はチッソ(N)・リン酸(P)・カリ(K)と同じく植物の成長に欠かせない必須多量元素です。

★硫黄(S)はチッソ(N)とともに含硫アミノ酸としてタンパク質を構成しており、不足すると葉の黄化や生育不良の原因となることが考えられます。

育苗箱にパラッと撒いて初期生育向上！

細粒タイプの硫酸カルシウム資材「イナズマS」

イナズマSの成分分析例 (%)

カルシウム	水溶性 カルシウム	硫 黄
28.5	26.3	17.0

※水溶性カルシウムは、現物1gに水500mLを加え抽出し測定。

【施用時期】

移植直前

※移植前の早すぎる施用は葉先等の痛みの原因となるため、移植直前に施用してください。

【育苗箱施用の施用量目安】


育苗箱20～40枚あたり1袋 (5kg)

育苗箱1枚あたり125～250g

細粒タイプで撒き方いろいろ！

手散布から機械散布※まで幅広い施用方法が可能です！

※機械散布の場合には、使用される機材で実際に散布が可能かをご確認ください。



ご使用方法にご不明な点がある場合は最寄りのJAにお問い合わせください。

販売



JAグループ

製造



片倉コープアグリ株式会社