

2025年産(は)おけさ柿栽培管理日誌

J A 佐 渡
TEL 0259-88-3133

私は、栽培・防除指針を遵守して2025年産はおけさ柿を生産し、その内容を全て下記に記入して報告します。

2025年 月 日 氏 名				⑩	J A 確認者名		確認日	確認印
支 部 名					J A 佐渡赤泊営農農機課	月 日	⑩	
住 所		佐渡市						
電話番号		0259 - -						
刀根早生		a	平 核 無	a		月 日	⑩	

1. 農藥使用履歷

月	病 害 虫 防 除			収穫前日数 ／ 総使用回数	防 除 記 入 欄 使用薬剤名と希釈倍率が防除暦と同じ箇所は○印を記入する					
	散布時期	使用薬剤	希釈倍率		使用薬剤名	希釈倍率	10a当たり 散布量	防除日		
3 月	3 月中旬迄	ハーベストオイル	50倍	発芽前		倍	ℓ	月 日		
5 月	5 月上中旬 (臨時)	トクチオン水和剤	800倍	75日／2回		倍	ℓ	月 日		
						倍				
		(展着剤)			()	倍				
6 月	開花直前	デランフロアブル	2,000倍	90日／5回		倍	ℓ	月 日		
		オルトラン水和剤	1,500倍	45日／2回		倍				
	6 月中旬 (無ホ [®] ルト ⁻ 系開花12日後) (ホ [®] ルト ⁻ 体系開花12日後)	オーソサイド水和剤80	1,000倍	7日／5回		倍	ℓ	月 日		
		トクチオン水和剤	800倍	75日／2回		倍				
		(展着剤)			()	倍				
		I Cボルドー412	50倍	<ボルドー体系>		倍			ℓ	月 日
		トクチオン水和剤	800倍	75日／2回		倍				
	6 月下旬 (無ホ [®] ルト ⁻ 系開花24日後) (ホ [®] ルト ⁻ 体系開花26日後)	チオノックフロアブル	500倍	30日／2回		倍	ℓ	月 日		
		トランスフォームフロアブル	1,500倍	前日／3回		倍				
		(展着剤)			()	倍				
		I Cボルドー412	50倍	<ボルドー体系>		倍			ℓ	月 日
		スミチオン水和剤40	1,000倍	30日／3回		倍				
	7 月	7 月上中旬	ストライド顆粒水和剤	3,000倍	14日／4回		倍	ℓ	月 日	
コルト顆粒水和剤			2,000倍	前日／3回		倍				
(展着剤)					()	倍				
I Cボルドー412			50倍	<ボルドー体系>		倍	ℓ			月 日
キラップフロアブル			2,000倍	7日／2回		倍				
7 月中下旬 (無ホ [®] ルト ⁻ 体系のみ)		キノンドーフロアブル	1,000倍	14日／5回		倍	ℓ	月 日		
		キラップフロアブル	2,000倍	7日／2回		倍				
7 月下旬～8 月上旬 (無ホ [®] ルト ⁻ 系は臨時) (ホ [®] ルト ⁻ 体系は5回目)		ストロビードライフロアブル	3,000倍	14日／3回		倍	ℓ	月 日		
		テルスター水和剤	1,000倍	14日／2回		倍				
8 月		8 月中旬	ベルクート水和剤	1,500倍	14日／3回		倍	ℓ	月 日	
	テッパン液剤		2,000倍	前日／2回		倍				
	8 月下旬	トランスフォームフロアブル	1,500倍	前日／3回		倍	ℓ	月 日		
9 月	9 月20日迄	トップジンM水和剤	1,500倍	前日／6回		倍	ℓ	月 日		
		アグロスリン水和剤	1,500倍	前日／3回		倍				
		(展着剤)			()	倍				

2. 土づくり・施肥（昨年秋の礼肥から記入する）

施肥月日	肥料名	10a当たり施用量	全面積の施用量		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月	日

3. 除草剤使用

使用薬剤名	希釈倍率	10a当たり 散布量	防除日
	倍	ℓ	月 日
	倍	ℓ	月 日
	倍	ℓ	月 日