

梅雨入り前に確実な中干し開始を！

5月中旬田植えのほ場でも、既に中干し開始適期を過ぎています。まだ実施していないほ場では、中干しを開始しましょう。

週末以降は降雨が続く天気予報です。用水不足が心配されるほ場でも、降雨による水分補給を見越して中干し・溝切りを行いましょう。

1 6月20日現在のコシヒカリ生育状況 (拠点9地点平均、移植日平均5月9日)

草丈：やや長、茎数：多、葉数の進み：やや早、葉色：濃

区分	本年値	目標比・差	前年比・差
草丈 (cm)	40	108%	99%
茎数 (本/m ²)	470	115%	114%
葉数 (葉)	9.1	+0.4	+0.2
葉色 (SPAD値)	41.6	+2.6	+2.0

2 コシヒカリの管理ポイント

- (1) 中干し開始後、地固めができたなら、溝切りを必ず実施する。
- (2) 乾かし過ぎないように田面の状態に注意し、大きなヒビが入らないよう走り水かん水を行う。
- (3) 漏水が多いほ場や用水が不便なほ場では強い中干しを控え、表面に小ヒビがみられたら中干しを終了し、間断かん水から飽水管理を行う。

3 その他の管理ポイント

- (1) カメムシ対策として、一斉草刈り(期間:6/20~29)を実施する。
- (2) いもち病の発生源となるので、補植苗はただちに除去する。